Anticorps monoclonal de souris (IgG1) anti-α-2-antiplasmine, 7AP

RUO 2°C 8°C

Produits Associés

Anticorps monoclonal de souris (IgG2a) anti-α-2-antiplasmine, 14AP

Référence	Présentation	Format
4-TC21263	Flacon	500 µg



Antigène : Reconnaît le néoantigène du complexe plasmine/α-2-antiplasmine.
Ne réagit pas avec le plasminogène libre ou l'alpha-2-antiplasmine libre.

Application : Western Blot, ELISA, inhibition de l'antiplasmine
Source : Souris
Immunogène : α-2-antiplasmine

Informations

Les lignes d'anticorps monoclonaux et polyclonaux des sociétés HTI et Technoclone complètent parfaitement notre gamme de protéines de la coagulation. Ils sont utiles dans une large variété d'applications telles que ELISA, Western blot, immunohistochimie et la purification. Nos anticorps polyclonaux sont généralement fournis sous forme de fractions purifiées d'IgG bien que des fractions purifiées par affinité ou des formes conjuguées soient disponibles sur demande. Enfin, nous offrons une ligne d'anticorps monoclonaux de rat anti-murins et des anticorps polyclonaux anti-murins de mouton contre les protéines de la coagulation de la souris.

Caractéristiques

Anticorps lyophilisé à partir d'une solution de 1mg/mL dans un tampon PBS à pH 7,4 contenant 0,02% d'azide de sodium et 20mg/mL de mannitol.
Après reconstitution les anticorps doivent être aliquotés et stockés à -20°C.
Eviter les cycles répétés de congélation et décongélation.

