## ANTICORPS MONOCLONAUX

### Anti-scu-PA (activateur du plasminogène de type urokinase)

# Anticorps monoclonal de souris anti-scu-PA humain, PUK

RUO 2°C 8°C

| Référence | Présentation | Format |
|---|---|---|
| 4-TC21383 | Flacon | 500 µg |




## Informations

Appartenant à la famille des sérines protéases.
L'uPA active le plasminogène pour le convertir en plasmine, enzyme permettant la dégradation de la fibrine.
Elle intervient dans les phases de dissolution du caillot durant la fibrinolyse. Il a également été montré une augmentation de la quantité d'u-PA dans certaines tumeurs.

**Antigène : simple chaîne de l'urokinase**

Application : ELISA
Source : Souris
Immunogène : simple chaîne de l'urokinase humaine recombinante

## Caractéristiques

Anticorps lyophilisé à partir d'une solution de 0.5 mg/mL dans un tampon de 10 mM de bicarbonate pH 9.6. Après reconstitution les anticorps doivent être aliquotés et stockés à -20°C. Eviter les cycles répétés de congélation/décongélation.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr