Solutions

Synthetic Procoagulant Phospholipid I

RUO 2°C 8°C 14J 2-8°C

Référence	Présentation	Format
20-X9113	Flacon	1 x 25 mg

Informations

Les phospholipides constituent une surface catalytique pour l'activation enzymatique des facteurs de la coagulation.

Les anticoagulants circulants lupiques sont des autoanticorps hétérogènes de type IgG et IgM directement dirigés contre une variété de phospholipides anioniques comme la cardiolipine, la phosphatidylsérine ou le phosphatidylinositol ou contre des protéines ayant la capacité de se lier aux phospholipides comme la β2-glycoprotéine I (β2-GPI).

L'apport de phospholipides (PL) ne modifie pas les taux de facteurs VIII, IX, XI, XII sur les plasmas normaux sans déficit ni LA.
L'apport de PL ne modifie pas les taux de facteurs VIII, IX, XI, XII sur les plasmas déficitaires connus avec et sans LA (déficit isolé constitutionnel ou acquis)
L'apport de PL entraîne une augmentation des facteurs VIII, IX, XI, XII sur des plasmas avec LA.

Mélange de phospholipides hautement purifiés à diluer.

Composants du coffret

- 1 flacon en verre de 25 mg

Caractéristiques

Proportion de dioléoyl phosphatidyl sérine: dioléoyl phosphatidyl choline (DOPS: DOPC) = 3 : 7.
Activité beaucoup plus élevée et meilleure reproductibilité que les phospholipides cérébraux.

DOPS : dioleyl phosphatidyl serine
DOPC : dioleyl phosphatidyl choline



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr