Anticorps monoclonal de souris (IgG1) anti-α-2-antiplasmine, 2AP

RUO 2°C 8°C

Produits Associés

Anticorps monoclonal de souris (IgG1) anti-α-2-antiplasmine, 7AP

Anticorps monoclonal de souris (IgG2a) anti-α-2-antiplasmine, 14AP

Informations

L'alpha 2-antiplasmine (α-2-antiplasmine ou α-2-AP) est le principal inhibiteur de la plasmine, enzyme clé de la fibrinolyse.
Elle se lie au FXIII et à la fibrine, permettant la stabilisation du thrombus.

Référence	Présentation	Format
4-TC21083	Flacon	500 µg

Antigène : α-2-antiplasmine natif, complexé ou dégradé.

Application : ELISA
Source : Souris
Immunogène : α-2-antiplasmine purifiée



Caractéristiques

Anticorps lyophilisé à partir d'une solution de 1mg/mL dans un tampon PBS à pH 7,4 contenant 0,02% d'azide de sodium et 20mg/mL de mannitol.
Après reconstitution les anticorps doivent être aliquotés et stockés à -20°C.
Eviter les cycles répétés de congélation et décongélation.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr