Plasma humain Déficient en prothrombine immunodéplété

RUO -70°C

Produits Associés

- Plasma humain Déficient congénital Facteur II > 5 %
- Plasma humain Déficient congénital Facteur IX (sévère < 1 %)
- Plasma humain Déficient congénital Facteur IX > 5 %

Référence	Présentation	Format
9-FII-ID	Flacon	à partir de 50 mL

Plasma déficient pour le dosage de la prothrombine.

Informations

Le Facteur II (FII) ou prothrombine est une glycoprotéine synthétisée par le foie, zymogène d'une sérine protéase. C'est un facteur de coagulation vitamine K-dépendant. Sa demi-vie est de 50 à 120 heures.
Le FII est activé par le complexe prothrombinase en thrombine qui joue un rôle central dans le processus de coagulation.
Elle va transformer le fibrinogène en fibrine, amplifier sa propre formation et activer les systèmes de la protéine C, du TAFI et les plaquettes.

Points forts

Réduit le temps nécessaire pour la mise en place de vos protocoles de tests.
Prêt à l'emploi après décongélation.

Caractéristiques

Les plasmas congelés, immunodéplétés sont certifiés avoir moins de 1% pour le facteur déficient considéré.
La congélation à -80°C des plasmas permet de conserver parfaitement intacte la matrice et d'éviter une reconstitution.
Nos colis contiennent de la carboglace pour le transport.
Aucun additif ou agent de conservation.
Date d'expiration > 1 année.
Flacons en plastique.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr